

Щенок ездит на попе: почему это происходит и что делать

Многие владельцы замечают, как щенок ездит на попе, словно пытается почесать область под хвостом. Такое поведение выглядит забавно, но часто сигнализирует о дискомфорте в задней части тела. Прежде чем делать выводы, стоит внимательно проанализировать, что именно беспокоит питомца.

<https://www.panram.ru/partners/news/v-kakikh-sluchayakh-nado-vyzyvat-veterinara-na-dom/>

Езда на попе — не отдельный диагноз, а видимый признак проблемы с параанальными железами, кожей, кишечником или задними лапами. Иногда достаточно несложных мер, в других нужна консультация специалиста. Чем раньше вы поймёте причину, тем легче будет вернуть щенку комфорт.

Основные причины такого поведения

Область вокруг хвоста у щенков чувствительна, поэтому зуд или боль заставляют искать прохладную и твёрдую поверхность. Наиболее частая причина — закупорка или воспаление анальных мешочков, которые расположены по бокам от ануса. Если их секрет застаивается, возникает выраженный зуд, и щенок начинает ездить попой о пол.

Другие причины включают заражение паразитами, реакцию на корм или среду, жидкий стул с раздражением кожи, а также ушиб хвоста или задних лап. Иногда так проявляется боль в тазовой области. Важно посмотреть на поведение в целом: активность, аппетит, характер стула и состояние шерсти у основания хвоста.

Анальные мешочки: как заподозрить проблему

Если щенок ездит на попе и при этом покусывает область под хвостом, выраженно беспокоен или садится осторожно, это может указывать на воспаление анальных мешочков. При запущенном состоянии появляются припухлость, покраснение или неприятный запах. Попытки выжать секрет дома без опыта может навредить: легко травмировать ткани и занести инфекцию.

При появлении гноя, появился канал с отделяемым или щенок вялый и отказывается от еды, нужен врач. Специалист проверит железы, при необходимости очистит их и назначит лечение. Дома важно не давить наугад и не откладывать визит.

Уход за областью под хвостом

Грязь под хвостом после прогулки или поноса может вызывать раздражение и желание чесаться. Регулярно проверяйте область вокруг ануса, укорачивайте слишком длинную шерсть и аккуратно подмывайте тёплой водой с подходящим шампунем. После процедуры просушите кожу, чтобы не создавать влажную среду.

Наружные паразиты тоже способны вызывать зуд в области хвоста. Осматривайте щенка после прогулок, используйте рекомендованные препараты по возрасту. Если на коже есть повреждения, красные пятна или залысины, лучше показать питомца врачу.

Когда причина внутри

Жидкий стул, задержка стула или слишком частые походы в туалет раздражают ткани вокруг ануса и могут заставлять щенка тереться о пол. Причинами бывают резкая смена рациона, избыток еды, паразиты или воспалительный процесс. Отследите за регулярностью стула и его видом.

Если стул с кровью, большом количестве слизи или тёмном окрасе не давайте лекарства наугад. Доступ к воде и лёгкая еда могут помочь, но точную причину определяет специалист. Не применяйте лекарства для людей без назначения: многие из них токсичны для собак.

Глисты и паразиты

Гельминты часто вызывают зуд в области ануса, особенно ночью или утром. Щенок может тереться о ковёр, покусывать хвост и беспокойно спать. Уточнить наличие паразитов помогает анализ.

Профилактика включает плановую обработку от глистов по возрасту и контроль на прогулках. Не выбирайте средства без учёта веса и возраста: дозировка имеет значение. Если щенок становится вялым, не ест или у него рвота, нужна незамедлительная консультация.

Проверяем движение

Иногда щенок ездит на попе не из-за зуда, а потому что ему дискомфортно стоять на задние лапы. Если походка изменилась, движения стали осторожными или нежелании играть стоит проверить на повреждения. Осмотрите подушечки, коготки и коленные суставы на припухлость и боль.

Активные игры на скользком полу могут привести к растяжению или удару. Постелите коврик, ограничьте прыжки и позвольте восстановиться. Если симптом сохраняется дольше суток, обратитесь за осмотром.

Первые шаги без вреда

- Проверьте зону вокруг ануса: нет ли припухлости и загрязнений.
- Оцените качество стула: жидкий стул, прожилки крови или слизистые выделения — повод для визита.
- Не давайте лекарства без назначения, особенно предназначенные людям.
- Проводите обработки по возрасту и соблюдайте график.
- Сделайте место удобным, чтобы щенок не скользил и не повредил лапы.

Когда причина неясна, не экспериментируйте наугад. Запишите, когда появилось поведение, что было до этого и как изменялся аппетит. Это поможет врачу точнее определить проблему.

Тревожные признаки

Обратитесь за помощью, если [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) щенок делает так слишком часто, скулит при прикосновении, отказывается от еды или начинается рвота. Также важны гнойные выделения, неприятный запах, выраженная припухлость и горячая кожа в области под хвостом.

Если в моче есть кровь, попытках сходить в туалет без результата или сильной слабости не ждите. Специалист проверит питомца, при необходимости сделает УЗИ и назначит подходящую терапию. Своевременный визит помогает быстрее поправиться.

Как снизить риск повторения

Регулярный осмотр области под хвостом, внимание к пищеварению и защита от паразитов снижают вероятность раздражения и воспаления. Подходящий рацион, умеренные прогулки и чистая вода поддерживают здоровье.

Стригите шерсть вокруг ануса, если она мешает гигиене, и проверяйте лапы после улицы. Не игнорируйте повторяющееся поведение: скольжение на попе почти всегда имеет телесную причину. При неясной ситуации спросите врача.

Заключение

Щенок ездит на попе — это признак проблемы, а не вредная привычка. Сначала понаблюдайте: проверьте область под хвостом, пищеварение и походку. Если причина неочевидна или состояние становится хуже, нужна помощь специалиста.

Часто задаваемые вопросы

Что заставляет щенка тереться попой о пол?

Наиболее вероятно это дискомфорт в области анальных мешочков, а также раздражение кожи, паразиты или проблемы со стулом. Что именно происходит поможет определить ветеринарный осмотр.

Насколько это серьёзно?

Как отдельное действие езда на попе не опасно, но повод может требовать лечения. Если есть гнойные выделения, кровянистые следы, сильная боль или потеря аппетита, следует обратиться без промедления.

Можно ли выдавить параанальные железы самостоятельно?

Если нет навыка лучше не пытаться: можно травмировать ткани и вызвать воспаление. Эту процедуру выполняет ветеринар, который оценит состояние и покажет правильную технику.

Могут ли паразиты вызывать такое поведение?

Да. Гельминты вызывают раздражение заднего прохода, особенно после сна. Подтвердить заражение помогает исследование, после чего врач назначит обработку по возрасту и весу.

Когда обращаться к врачу?

Если щенок делает так постоянно, появляется болезненный писк, нет аппетита, начинается рвота или гнойные выделения, запишитесь на приём. Своевременная проверка помогает ускорить лечение.

Что делать для профилактики?

Регулярно осматривайте область под хвостом, контролируйте пищеварение, проводите обработку от паразитов и ухаживайте за шерстью. Сбалансированный рацион и умеренная нагрузка уменьшают вероятность повторения проблемы.